大腸ポリープ切除を希望される方へ

大腸検査でポリープが見つかった際に切除を希望される方は、この用紙に署名の上、当日、外来の看護師にお渡しください。
なお、ご質問があれば、担当看護師・医師にご相談ください。

●切除する大腸ポリープについて
・大腸ポリープは、癌になるものとならないものとがあります。
・切除するのは、すでに癌化したポリープや癌化の可能性があるポリープです。
・癌化の可能性の少ないものや、小さいもの（１～２mm）は切除しません。

●安全性・問題点
・ポリープ切除は基本的に痛みを生ずることはなく、安全に行われます。
・非常にまれではありますが、切除直後や切除後１週間以内に、出血や穿孔（腸に穴があくこと）を起こすことがあります。この場合、当日入院していただいたり、輸血を行ったり、内視鏡検査を再度行ったり、緊急手術が必要な場合があります。
・血液をサラサラにする薬を直前まで飲んでいる場合、大きなポリープで入院切除の方が安全な場合、その他の理由にて当日切除しないこともあります。

●ポリープ切除後の注意事項
・切除後１週間以内は腹痛・出血に注意が必要です。その期間は、遠方への旅行、アルコール摂取、重い物を持つ、長風呂などを避けてください。もし避けられない場合、当日の切除を見合わせるか、検査日程を変更してください。

咲花病院　病院長殿

上記をよく理解した上で、ポリープ切除を行うことを希望します。

令和　　年　　月　　日

患者氏名

代理人氏名
（患者との続柄　　）

大腸ポリープ切除を希望される方へ

大腸検査でポリープが見つかった際に切除を希望される方は、この用紙に署名の上、当日、外来の看護師にお渡しください。
なお、ご質問があれば、担当看護師・医師にご相談ください。

●切除する大腸ポリープについて
・大腸ポリープは、癌になるものとならないものとがあります。
・切除するのは、すでに癌化したポリープや癌化の可能性があるポリープです。
・癌化の可能性の少ないものや、小さいもの（１～２mm）は切除しません。

●安全性・問題点
・ポリープ切除は基本的に痛みを生ずることはなく、安全に行われます。
・非常にまれではありますが、切除直後や切除後１週間以内に、出血や穿孔（腸に穴があくこと）を起こすことがあります。この場合、当日入院していただいたり、輸血を行ったり、内視鏡検査を再度行ったり、緊急手術が必要な場合があります。
・血液をサラサラにする薬を直前まで飲んでいる場合、大きなポリープで入院切除の方が安全な場合、その他の理由にて当日切除しないこともあります。

●ポリープ切除後の注意事項
・切除後１週間以内は腹痛・出血に注意が必要です。その期間は、遠方への旅行、アルコール摂取、重い物を持つ、長風呂などを避けてください。もし避けられない場合、当日の切除を見合わせるか、検査日程を変更してください。

咲花病院　病院長殿

上記をよく理解した上で、ポリープ切除を行うことを希望します。

令和　　年　　月　　日

患者氏名

代理人氏名
（患者との続柄　　）